

HERPETOFAUNA DO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ, REGIÃO SUDESTE DO ESTADO DO PIAUÍ

JANDÁRIA SILVA DOS SANTOS, HERIVELTO FAUSTINO DE OLIVEIRA, MARCIANA CLAUDIO DA SILVA, ROBSON WALDEMAR ÁVILA, ROBSON WALDEMAR ÁVILA

A caatinga, único bioma restrito ao território brasileiro, apesar de possuir uma diversidade considerável de anfíbios e répteis permanece com várias lacunas de amostragem. Dentre essas regiões, a porção sudeste do estado do Piauí ainda pode ser considerada como uma das menos amostradas. O município de Brejo do Piauí, apesar de está inserido no Parque Nacional da Serra da Capivara, região bem amostrada quanto a herpetofauna ainda carece de informações. A coleta de dados foi realizada nos períodos seco e chuvoso em 5 localidades do município de Brejo do Piauí denominadas de ponto H17 (8° 13' 36"S 42° 49' 51"W) ponto H17a (8° 13' 58"S 42° 42' 24"W) ponto H17b (8° 16' 47"S 42° 42' 25"W) ponto H17c (8° 12' 17"S 42° 51' 43"W) e sede do município (8° 12' 12"S 42° 49' 24"W), as coletas ocorreram em 2006 que foram realizadas de 19 de junho à 01/07 no período seco e de 26/11 à 06/12 no período chuvoso; em 2008 foram realizadas apenas no período seco de 08 à 28/10; em 2009 o procedimento foi efetuado de 20/05 à 05/06 no período chuvoso e de 03 à 16/12 no período seco; e em 2010 a prática realizou-se apenas no período chuvoso de 31/05 à 17/06. Os métodos utilizados foram procuras visuais limitadas por tempo, encontros ocasionais e censo auditivo. Os espécimes capturados foram eutanasiados com lidocaína a 4%, fixados com formol a 10%, conservados em álcool 70%. Os anfíbios foram representados por 20 espécies distribuídas em 5 famílias: Hylidae (6), Bufonidae (2), Microhylidae (2), Leptodactylidae (5) e Leiuperidae (5). Quanto aos répteis, foram encontradas 20 espécies, das quais 8 são de serpentes distribuídas em 2 famílias: Boidae (2) e colubridae (06); dez espécies de lagartos, distribuídas em 5 famílias: Iguanidae (1), Tropiduridae (2), Gekkonidae (2), Teiidae (3) e Phyllodactylidae (1); 1 espécie de cágado da família Chelidae (1) e 2 espécies de jacaré da família Alligatoridae (2). O presente trabalho contribui para a compreensão da composição da herpetofauna local.

PALAVRAS-CHAVE: DIVERSIDADE, ANFÍBIOS E RÉPTEIS

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER