

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO

ERIVANE RODRIGUES DE ALENCAR SANTOS, ALINIANA DA SILVA SANTOS, RAQUEL LUCENA NICODEMOS, FRANCISCA RAQUEL ALMEIDA FEITOSA, MARIA CORINA AMARAL VIANA

Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença que apresenta ampla distribuição em países de clima subtropical e sua Epidemiologia é claramente determinada por fatores ambientais. Um fator determinante é o desconhecimento por parte da população de que a LV é uma doença grave e de alta letalidade, principalmente em indivíduos não tratados e em crianças desnutridas. **Objetivo:** Conhecer o perfil epidemiológico dos casos notificados de Leishmaniose Visceral no município de Crato-CE. **Metodologia:** Trata-se de um estudo documental, realizado por meio da investigação de dados epidemiológicos notificados sobre leishmaniose visceral no período de 2008 a 2012. O presente estudo foi desenvolvido no Município de Crato, coletados em 2013 na Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do referido Município, através das fichas de investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. **Resultados:** No Crato foram notificados e confirmados 39 casos de LV. Na descrição do perfil epidemiológico da LV, foram estudados 39 casos, sendo 20 do sexo masculino e 19 do sexo feminino. Foi possível perceber um declínio no número de dos casos notificados entre 2008 (12 casos) e 2012 (02 casos) e a maioria dos casos se enquadra no perfil de faixa etária entre 01 e 09 anos. A variável escolaridade demonstrou que uma pessoa que nunca frequentou uma escola, ou que se classifica como analfabeto, tem mais chances de ser acometido por leishmaniose visceral do que um indivíduo alfabetizado. A ocorrência média de casos novos da doença foi mais elevada na zona urbana (27), seguida da zona rural (11) e da zona periurbana (1). **Considerações Finais:** A LV no município de Crato encontra-se em processo de urbanização, uma vez que o número de casos encontrados na zona urbana foi maior. As ações de controle e combate devem ser realizadas e avaliadas continuamente, para melhorar a ação da vigilância epidemiológica e conseqüentemente a diminuição e/ou erradicação dessa doença.

PALAVRAS-CHAVE: LEISHMANIOSE VISCERAL, EPIDEMIOLOGIA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.

ÁREA TEMÁTICA: ENFERMAGEM

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER