

PREVALÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM GESTANTES DO CEARÁ NO PERÍODO ENTRE 2007 A 2013

MARIA KLEYSSIANE DE MELO ALEXANDRE, ANTHONY MOREIRA GOMES, DANIELLY STÉFHANY DA SILVA GONZAGA, HENRIQUE AHIORAN HOLANDA, RENATO JUCIANO FERREIRA

A leishmaniose visceral no Brasil é endêmica e com maior concentração dos casos no Nordeste, onde nos últimos anos, houveram notificações de casos em gestantes levando ao risco de transmissão vertical. Objetivou-se descrever a epidemiologia da leishmaniose visceral em gestantes no Ceará, no período entre 2007 a 2013. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva, descritiva e de natureza quantitativa. As informações foram obtidas do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram registrados nove casos, destes a maioria foi diagnosticado ainda no primeiro trimestre gestacional. Mesmo sendo baixa a prevalência da leishmaniose visceral em gestantes, representa um fator de risco materno-fetal, sendo importante o diagnóstico precoce e tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: CALAZAR. TRANSPLACENTÁRIA. GRAVIDEZ.

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE

FORMA DE APRESENTAÇÃO: ORAL