

PREVALÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE NO PERÍODO ENTRE 2007 A 2013.

ANTHONY MOREIRA GOMES, MARIA KLEYSSIANE DE MELO ALEXANDRE, RENATO JUCIANO FERREIRA

A leishmaniose visceral é uma antropozoonose crônica, grave e de caráter emergente mais comum e presente no Brasil, podendo ser letal se não tratada adequadamente. O estado do Ceará ainda continua sendo uma área de grande incidência dessa doença nos últimos anos, apesar dos programas de vigilância e controle. Neste contexto, objetivou-se investigar os aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral no município de Crato - CE no período entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2013. O presente estudo trata-se de uma pesquisa retrospectiva, descritiva e de natureza quantitativa. Os dados secundários foram obtidos na base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Foram registradas 70 notificações, com maioria pertencente à zona urbana, e destes 61 foram diagnosticados com leishmaniose visceral, onde a maioria dos indivíduos acometidos tinha idade > 4. A taxa de letalidade da doença foi de 3,28%, assim como os óbitos por outras causas, enquanto a taxa de cura apresentou um índice bastante considerável (88,5%). Mesmo apresentando baixos índices de morbidade/mortalidade faz-se necessário melhoria na vigilância e controle da leishmaniose visceral no município do Crato.

PALAVRAS-CHAVE: LEISHMANIOSE VISCERAL. EPIDEMIOLOGIA. VIGILÂNCIA.

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE

FORMA DE APRESENTAÇÃO: ORAL