

IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM LACTENTE COM DIAGNÓSTICO DE BRONQUITE AGUDA

WELLHINGTON DA SILVA MOTA, LUCIANE GUEDES SISNANDO, ARIADNA MOISÉS DO NASCIMENTO ARRAIS RIBEIRO,
SANDINO PEREIRA BATISTA, JOHN CARLOS DE SOUZA LEITE

O presente estudo tem como objetivo implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem ao lactente acometido por bronquite aguda. Caracteriza-se como um estudo de caso, de caráter descritivo, exploratório, qualitativo, no qual informações nele contidas foram coletadas em um hospital infantil de referência, localizado no município de Juazeiro do Norte-Ceará, Brasil, durante aula prática em janeiro de 2016. O relato de caso deu-se a partir de um lactente de trinta dias, com diagnóstico de bronquite aguda e pneumonia. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se roteiro de histórico de enfermagem padronizado pela disciplina, e as fichas de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) do prontuário. Através da identificação das necessidades humanas básicas do lactente, a partir da obtenção da anamnese e exame físico, foram estabelecidos os principais diagnósticos de enfermagem, com suas respectivas metas e intervenções a partir da SAE. Lactente, 30 dias, masculino, natural e residente de Juazeiro do Norte, com informante a mãe, nasceu de parto normal, APGAR: 9 - 10. Sem história de intercorrência no período gestacional e parto; com antecedentes de pai e avó tabagistas, reside em zona urbana. EG bom, ativo, hidratado, anictérico, acianótico, afebril. T: 37,1°C, FR = 45 mrp, higienizado, obstrução nasal, pescoço sem presença de nódulos palpáveis, respiração abdominal, presença de ruídos (sibilos/estertores) no hemotórax direito, tórax simétrico, abdome flácido, sem sensibilidade à palpação, coto umbilical cicatrizado. Em aleitamento materno não exclusivo, fazendo uso de leite modificado; diurese franca de aspecto límpido, evacuações pastosas de coloração amarelada, sono e repouso prejudicado. Região perianal e genital hiperemiada. Genitora refere dificuldade de pega e obstrução nasal. Para o referido estudo priorizou-se para a intervenção como fenômeno respiratório a Desobstrução ineficaz das vias aéreas e o Padrão respiratório ineficaz. As principais intervenções traçadas foram administração de medicamentos conforme prescrição médica de broncodilatadores, antimicrobianos, inaloterapia/oxigenoterapia; manter decúbito elevado, monitorização respiratória e térmica. Ao propor um cuidar eficaz, a enfermagem faz uso de uma ferramenta baseada em saberes científicos, subsidiado a partir da SAE possibilitando o reconhecimento das necessidades de cuidados nas quais é necessário intervir, educar e prestar cuidados colaborando com o tratamento e evitando complicações. Verificou-se então evolução considerável do quadro clínico do lactente, como maior permeabilidade das vias aéreas e padrão respiratório eficaz oportuno.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM; SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM; BRONQUITE AGUDA

ÁREA TEMÁTICA: ENFERMAGEM

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER